



De geração em geração.



AGRO AMAZÔNIA



Produtividade da origem à colheita.





DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO.

Sumário

Dagma Sementes	4
Linha do tempo	5
Dagma 6525 I2X	6
Dagma 7225 I2X	8
Dagma 7825 CE	10
Dagma 6523 CE	12
Dagma 6524 I2X	14
Dagma 6822 IPRO	16
Dagma 6824 I2X	18
Dagma 7523 I2X	20
Dagma 7621 I2X	22
Dagma 7921 IPRO	24
Dagma 7924 I2X	26
Dagma 8024 E	28
Dagma 8121 IPRO	30
Dagma 8221 I2X	32
Dagma 8321 CE	34





Lançada em 2021, a Dagma Sementes iniciou sua atuação com as melhores biotecnologias do mercado. A marca vem crescendo de forma acelerada e consistente, com mais de 2 milhões de sacas de soja comercializadas nos últimos quatro anos. Essa expansão comprova como a empresa oferece constantemente alto desempenho, produtividade e uma ampla plataforma de resistência a nematoides para produtores de diferentes regiões do Brasil.

Hoje, a Dagma Sementes continua ampliando seu portfólio, lançando nesta safra três novos produtos que, somados às soluções já existentes, buscam proporcionar altos tetos de produtividade e manejo sustentável à agricultura brasileira.

Variedades com as melhores biotecnologias do mercado.





NOVIDADE

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Precocidade
- Boa arquitetura de planta
- Porte controlado
- Ampliação da janela de plantio da segunda safra

GM – 6.5

PMG – 173 g

Porte – 79 cm

Exigência em fertilidade – Alta

Hábito de crescimento – Indeterminado

Ramificação – Baixa

Acamamento – Moderadamente resistente


STS™ – Suscetível

SANIDADE

Resistência ao cancro da haste.

Resistência à mancha-olho-de-rã.

Resistência à pústula bacteriana.



TECNOLOGIA

INTACTA2
XTEND



RECOMENDAÇÕES

Estado	Detalhe	Micro	Grupo de maturação	Ciclo médio (dias) ¹	Preferencial	Tolerado	Exigência à fertilidade	População (plantas/ha)
MG	Pontal	302	6.5	106	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	280 - 320 mil
	Sul	302	6.5	120	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	250 - 300 mil
	Alto Paranaíba	303	6.5	106	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	280 - 320 mil
	Triângulo	303	6.5	106	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	280 - 320 mil
SP	Norte	302	6.5	106	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	280 - 320 mil

¹ Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas, considerando os dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, recomenda-se aumentar em 10% a população de plantas indicada.



NOVIDADE

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Resistência ao nematoide-de-cisto
- Boa arquitetura de planta

GM – 7.2

PMG – 180 g

Porte – 85 cm

Exigência em fertilidade – Alta

Hábito de crescimento – Indeterminado

Ramificação – Baixa

Acamamento – Moderadamente resistente

STS™ – Tolerante

SANIDADE


Resistência ao cancro da haste.

Resistência à pústula bacteriana.

Resistência moderada à mancha-olho-de-rã.

Resistência ao nematoide-de-cisto da raça 3.

Resistência moderada aos nematoides-de-cisto das raças 6, 9, 10, 14 e 14+.



TECNOLOGIA

INTACTA2[®]
XTEND



RECOMENDAÇÕES

Estado	Detalhe	Micro	up o dematuraç	iclo médio(dias	Preferencial	Tolerado	gênciaà fertilidç	ulação(plantas/ha)
MG	Pontal	302	7.2	115	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 260 mil
	Alto Paranaíba	303	7.2	115	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 280 mil
	Triângulo	303	7.2	115	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 280 mil
	Noroeste (irrigado)	304	7.2	109	10/10 - 25/11	05/10 - 30/11	5	240 - 300 mil
	Noroeste (sequeiro)	304	7.2	109	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
SP	Norte	302	7.2	115	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 260 mil
GO	Sudoeste	301	7.2	109	10/10 - 25/11	05/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
	Sudoeste e Sul	302	7.2	105	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
	Centro-Sul	303	7.2	115	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 300 mil
	Leste (irrigado)	304	7.2	109	10/10 - 25/11	05/10 - 30/11	5	240 - 300 mil
	Leste (sequeiro)	304	7.2	109	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
MT	Sul	401	7.3	106	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	320 - 380 mil
DF	Irrigado	304	7.2	109	10/10 - 25/11	05/10 - 30/11	5	240 - 300 mil
	Sequeiro	304	7.2	109	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
MS	Norte	301	7.2	109	10/10 - 25/11	05/10 - 30/11	5	240 - 320 mil

¹ Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas, considerando os dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. STS™ é uma marca registrada da DuPont™ de Nemours and Company ou de suas afiliadas, e é utilizada sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras.



NOVIDADE

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Boa arquitetura de planta
- Resistência ao nematoide-de-cisto

GM – 7.8 (MT) / 7.5 (GO, MS, MG, DF e SP)

PMG – 159 g

Porte – 84 cm

Exigência em fertilidade – Alta

Hábito de crescimento – Indeterminado

Ramificação – Média

Acamamento – Moderadamente resistente

STS™ – Suscetível

SANIDADE


Resistência ao cancro da haste.

Resistência à mancha-olho-de-rã.

Resistência à pústula bacteriana.

Resistência ao nematoide-de-cisto da raça 3.

Resistência moderada aos nematoides-de-cisto das raças 6, 9, 10, 14 e 14+.



TECNOLOGIA



RECOMENDAÇÕES

Estado	Detalhe	Micro	up o dematuraç	iclo médio(dias	Preferencial	Tolerado	gênciãà fertilidç	ulação(plantas/ha)
MG	Pontal	302	7.5	120	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 280 mil
	Alto Paranaíba	303	7.5	120	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 280 mil
	Triângulo	303	7.5	120	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 280 mil
	Noroeste (irrigado)	304	7.5	116	10/10 - 25/11	05/10 - 30/11	5	250 - 300 mil
	Noroeste (sequeiro)	304	7.5	116	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
SP	Norte	302	7.5	120	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 280 mil
GO	Sudoeste	301	7.5	116	10/10 - 25/11	05/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
	Sudoeste e Sul	302	7.5	112	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
	Centro-Sul	303	7.5	120	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 300 mil
	Leste (irrigado)	304	7.5	116	10/10 - 25/11	05/10 - 30/11	5	250 - 300 mil
	Leste (sequeiro)	304	7.5	116	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
MT	Sul	401	7.8	113	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	280 - 320 mil
	Médio-Norte	402	7.8	109	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	300 - 350 mil
	Oeste	402	7.8	111	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	300 - 350 mil
	Vale do Araguaia	403	7.8	109	20/10 - 30/11	25/10 - 25/11	5	300 - 350 mil
DF	Irrigado	304	7.5	116	10/10 - 25/11	05/10 - 30/11	5	250 - 300 mil
	Sequeiro	304	7.5	116	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
MS	Norte	301	7.5	116	10/10 - 25/11	05/10 - 30/11	5	240 - 320 mil

¹ Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas, considerando os dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. STS™ é uma marca registrada da DuPont™ de Nemours and Company ou de suas afiliadas, e é utilizada sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras.



PONTOS FORTES

- Alto pegamento de vagens
- Precocidade
- Permite antecipação da 2ª safra
- Responsiva a ambientes de alta tecnologia
- Porte controlado
- STS™ – Tolerante a sulfonilureias

GM – 6.5

PMG – 171 g

Porte – 81 cm

Exigência em fertilidade – Alta

Hábito de crescimento – Indeterminado

Ramificação – Baixa

Acamamento – Moderadamente resistente

SANIDADE

Resistência à podridão radicular de

Phytophthora – Raças 1 e 3.

Resistência à pústula bacteriana.



TECNOLOGIA



RECOMENDAÇÕES

Estado	Detalhe	Micro	up	o dematuraç	iclo médio(dias	Preferencial	Tolerado	gênci	à fertilid	ulaçã	o(plantas/ha)
MG	Norte e MG Pontal	302	6.5		104	30/10 - 15/11	25/10 - 20/11	5		280 - 320 mil	
	Sul	302	6.5		125	30/10 - 15/11	25/10 - 20/11	5		220 - 260 mil	
	Alto Paranaíba	303	6.5		104	30/10 - 15/11	25/10 - 20/11	5		280 - 320 mil	
	Triângulo	303	6.5		104	30/10 - 15/11	25/10 - 20/11	5		280 - 320 mil	

¹ Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas, considerando os dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicada. STS™ é uma marca registrada da DuPont™ de Nemours and Company ou de suas afiliadas, e é utilizada sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras.



PONTOS FORTES

- Bom porte de planta
- Bom potencial de ramificação
- Ampla região de adaptação
- Boa adaptação a regiões mais quentes
- Boa estabilidade produtiva

GM – 6.5


PMG – 162 g

Exigência em fertilidade – Média

Hábito de crescimento – Indeterminado

Ramificação – Média

Acamamento – Resistente



SANIDADE

Resistência à podridão radicular por *Phytophthora* da raça 1.

Resistência à pústula bacteriana.

TECNOLOGIA

INTACTA2
XTEND



RECOMENDAÇÕES

Estado	Detalhe	Micro	Grupo de maturação	Ciclo médio (dias) ¹	Preferencial	Tolerado	Exigência à fertilidade	População (plantas/ha)
MS	Arenito	202	6.5	112	25/09 – 20/11	20/09 – 30/11	2	200 – 320 mil
	Sul (sequeiro)	206	6.5	112	25/09 – 20/11	20/09 – 30/11	2	200 – 320 mil
	Oeste	207	6.5	112	25/09 – 20/11	20/09 – 30/11	2	200 – 320 mil

¹ Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas, considerando os dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. STS™ é uma marca registrada da DuPont™ de Nemours and Company ou de suas afiliadas, e é utilizada sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras.



PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Resistência ao nematoide-de-cisto
- Excelente arquitetura de planta
- Plantas com elevado volume de vagens

GM – 6.8

PMG – 167 g

Porte – 98 cm

Exigência em fertilidade – Alta

Hábito de crescimento – Indeterminado

Ramificação – Baixa

Acamamento – Moderadamente resistente


Ciclo médio M3 – 105 dias após a emergência

STS™ – Resistente

NEMATOIDES – CISTO

Resistência à raça 3.

Resistência moderada às raças 9, 10, 14 e 14+.



TECNOLOGIA

INTACTA RR2 PRO™



RECOMENDAÇÕES

Estado	Detalhe	Micro	Grupo de maturação	Ciclo médio (dias) ¹	Preferencial	Tolerado	Exigência à fertilidade	População (plantas/ha)
DF	Sequeiro	304	6.8	104	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
	Irrigado	304	6.8	104	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	5	240 - 280 mil
GO	Sudoeste	301	6.8	102	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
	Sudoeste e Sul	302	6.8	100	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
	Centro-Sul	303	6.8	110	20/10 - 25/11	15/10 - 30/11	5	200 - 280 mil
	Leste (irrigado)	304	6.8	104	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	5	240 - 280 mil
	Leste (sequeiro)	304	6.8	104	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
	Sul	302	6.8	126	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	200 - 260 mil
	Pontal	302	6.8	110	20/10 - 25/11	15/10 - 30/11	5	200 - 280 mil
MG	Alto Paranaíba	303	6.8	110	20/10 - 25/11	15/10 - 30/11	5	200 - 280 mil
	Triângulo	303	6.8	110	20/10 - 25/11	15/10 - 30/11	5	200 - 280 mil
	Noroeste (irrigado)	304	6.8	104	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	5	240 - 280 mil
	Noroeste (sequeiro)	304	6.8	104	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
MS	Norte	301	6.8	102	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	5	240 - 320 mil
	Sul	401	7.1	101	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	300 - 350 mil
MT	Médio-Norte	402	7.1	96	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	320 - 360 mil
	Oeste	402	7.1	96	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	320 - 360 mil
SP	Norte	302	6.8	110	20/10 - 25/11	15/10 - 30/11	5	200 - 280 mil

¹ Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas, considerando os dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. STS™ é uma marca registrada da DuPont™ de Nemours and Company ou de suas afiliadas, e é utilizada sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras.



PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Resistência ao nematoide-de-cisto
- Precocidade
- Resistência ao cancro da haste e à pústula bacteriana

GM – 6.8

PMG – 181 g

Exigência em fertilidade – Alta

Hábito de crescimento – Indeterminado

Ramificação – Média


Acamamento – Moderadamente resistente

STS™ – Resistente

NEMATOIDES – CISTO

Resistência à raça 3.

Resistência moderada às raças 6, 9, 10, 14 e 14+.



TECNOLOGIA

INTACTA²
XTEND



RECOMENDAÇÕES

Estado	Detalhe	Micro	Grupo de maturação	Ciclo médio (dias) ¹	Preferencial	Tolerado	Exigência à fertilidade	População (plantas/ha)
GO	Sudoeste	301	6.8	102	10/10 - 25/11	05/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
	Sudoeste e Sul	302	6.8	99	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
	Centro-Sul	303	6.8	110	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 300 mil
	Leste (irrigado)	304	6.8	101	10/10 - 25/11	05/10 - 30/11	5	240 - 300 mil
	Leste (sequeiro)	304	6.8	101	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
MG	Pontal	302	6.8	110	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 260 mil
	Sul	302	6.8	125	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	200 - 260 mil
	Alto Paranaíba	303	6.8	110	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 280 mil
	Triângulo	303	6.8	110	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 280 mil
	Noroeste (irrigado)	304	6.8	101	10/10 - 25/11	05/10 - 30/11	5	240 - 300 mil
	Noroeste (sequeiro)	304	6.8	101	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
MS	Norte	301	6.8	102	10/10 - 25/11	05/10 - 30/11	5	240 - 320 mil
DF	DF (irrigado)	304	6.8	101	10/10 - 25/11	05/10 - 30/11	5	240 - 300 mil
	DF (sequeiro)	304	6.8	101	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	260 - 320 mil
SP	Norte	302	6.8	110	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 260 mil
BA	Oeste	405	6.8	102	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	5	320 - 380 mil

¹ Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas, considerando os dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. STS™ é uma marca registrada da DuPont™ de Nemours and Company ou de suas afiliadas, e é utilizada sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras.



PONTOS FORTES

- Resistência ao nematoide-de-cisto
- Excelente arquitetura de plantas
- Elevado peso de grãos

GM – 7.5

PMG – 188 g

Porte – 88 cm

Exigência em fertilidade – Alta

Hábito de crescimento – Indeterminado


Ramificação – Baixa

Acamamento – Moderadamente resistente

NEMATOIDES – CISTO

Resistência à raça 3.

Resistência moderada às raças 6, 9, 10, 14 e 14+.



TECNOLOGIA

INTACTA²
XTEND



RECOMENDAÇÕES

Estado	Detalhe	Micro	Grupo de maturação	Ciclo médio (dias) ¹	Preferencial	Tolerado	Exigência à fertilidade	População (plantas/ha)
DF	Irrigado	304	7.5	113	10/10 - 20/11	05/10 - 25/11	5	180 - 240 mil
	Sequeiro	304	7.5	113	25/10 - 20/11	20/10 - 25/11	5	220 - 280 mil
	Sudoeste	301	7.5	115	10/10 - 20/11	05/10 - 25/11	5	220 - 280 mil
	Sudoeste e Sul	302	7.5	109	25/10 - 20/11	20/10 - 25/11	5	220 - 280 mil
	Centro-Sul	303	7.5	120	25/10 - 20/11	20/10 - 25/11	5	180 - 260 mil
	Leste (sequeiro)	304	7.5	113	25/10 - 20/11	20/10 - 25/11	5	220 - 280 mil
	Leste (irrigado)	304	7.5	113	10/10 - 20/11	05/10 - 25/11	5	180 - 240 mil
GO	Centro-Oeste	401	7.5	108	25/10 - 20/11	20/10 - 25/11	5	220 - 300 mil
	Norte	404	7.5	108	25/10 - 20/11	20/10 - 25/11	5	220 - 300 mil
	Pontal	302	7.5	120	25/10 - 20/11	20/10 - 25/11	5	180 - 260 mil
	Alto Paranaíba	303	7.5	120	25/10 - 20/11	20/10 - 25/11	5	180 - 260 mil
MG	Triângulo	303	7.5	120	25/10 - 20/11	20/10 - 25/11	5	180 - 260 mil
	Noroeste (sequeiro)	304	7.5	113	25/10 - 20/11	20/10 - 25/11	5	220 - 280 mil
	Noroeste (irrigado)	304	7.5	113	10/10 - 20/11	05/10 - 25/11	5	180 - 240 mil
MS	Norte	301	7.5	115	10/10 - 20/11	05/10 - 25/11	5	200 - 280 mil
SP	Norte	302	7.5	120	25/10 - 20/11	20/10 - 25/11	5	180 - 260 mil

¹ Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas, considerando os dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.



PONTOS FORTES

- Precocidade - 107 dias
- Sanidade
- Excelente arranque inicial
- A melhor variedade para abertura de plantio
- Resistência ao nematoide-de-cisto
- Bom comportamento contra mancha-alvo
- Grande volume de grãos
- Biotecnologia Intacta2 Xtend®

GM – 7.6

PMG – 178 g

Porte – Alto (95 cm)

Hábito de crescimento – Indeterminado


Ramificação – Baixa

Acamamento – Moderadamente resistente

NEMATOIDES – CISTO

Resistência à raça 3.

Resistência moderada às raças 9, 10 e 14.



TECNOLOGIA

INTACTA2
XTEND



RECOMENDAÇÕES

Estado	Detalhe	Micro	Grupo de maturação	Ciclo médio (dias) ¹	Preferencial	Tolerado	Exigência à fertilidade	População (plantas/ha)
BA	Oeste (irrigado)	405	7.6	109	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	5	300 - 380 mil
MA	Batavo	501	7.6	101	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	300 - 380 mil
MT	Sul	401	7.6	115	01/10 - 20/11	25/09 - 25/11	4	300 - 380 mil
	Oeste	402	7.6	108	01/10 - 20/11	25/09 - 25/11	4	320 - 380 mil
	Sudoeste	402	7.6	108	20/10 - 20/11	15/10 - 25/11	5	250 - 320 mil
	Médio-Norte	402	7.6	105	01/10 - 20/11	25/09 - 25/11	4	320 - 380 mil
	Vale do Araguaia	403	7.6	105	20/10 - 25/11	15/10 - 30/11	4	320 - 380 mil
RO	Abaixo de 400 m	402	7.6	108	10/10 - 20/11	05/10 - 25/11	4	250 - 320 mil
	Acima de 400 m	402	7.6	108	01/10 - 20/11	25/09 - 25/11	4	320 - 380 mil
TO	Transição	404	7.6	102	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	300 - 380 mil
	Campos Lindos	501	7.6	101	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	300 - 380 mil
	Transição	501	7.6	102	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	300 - 380 mil

¹ Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas, considerando os dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.

PONTOS FORTES

- Ciclo médio - 108 dias
- Elevado peso de grãos
- Excelente sanidade
- Bom comportamento contra mancha-alvo
- Ampla adaptabilidade territorial

GM – 7.9

PMG – 182 g


Porte – Alto (88 cm)

Exigência em fertilidade – Alta

Hábito de crescimento – Indeterminado

Ramificação – Média

Acamamento – Moderadamente resistente



TECNOLOGIA

INTACTA RR2 PRO™



RECOMENDAÇÕES

Estado	Detalhe	Micro	Grupo de maturação	Ciclo médio (dias) ¹	Preferencial	Tolerado	Exigência à fertilidade	População (plantas/ha)
BA	Oeste (irrigado)	405	7.7	114	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	5	180 - 240 mil
DF	Sequeiro	304	7.8	118	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	4	180 - 240 mil
	Irrigado	304	7.8	118	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	4	160 - 200 mil
GO	Sudoeste	301	7.8	118	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	4	180 - 240 mil
	Sudoeste e Sul	302	7.8	114	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	4	180 - 240 mil
	Centro-Sul	303	7.8	125	20/10 - 25/11	15/10 - 30/11	4	160 - 220 mil
	Leste (sequeiro)	304	7.8	118	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	4	180 - 240 mil
	Leste (irrigado)	304	7.8	118	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	4	160 - 200 mil
	Centro-Oeste	401	7.8	113	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	4	180 - 260 mil
	Norte	404	7.8	114	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	4	180 - 260 mil
MA	Sul	501	7.9	104	30/10 - 30/11	25/10 - 05/12	5	280 - 350 mil
	Batavo	501	7.9	105	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	250 - 320 mil
MG	Pontal	302	7.8	125	20/10 - 25/11	15/10 - 30/11	4	160 - 200 mil
	Triângulo	303	7.8	125	20/10 - 25/11	15/10 - 30/11	4	160 - 200 mil
	Alto Paranaíba	303	7.8	125	20/10 - 25/11	15/10 - 30/11	4	160 - 200 mil
	Noroeste (sequeiro)	304	7.8	118	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	4	180 - 240 mil
	Noroeste (irrigado)	304	7.8	118	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	4	160 - 200 mil
MS	Norte	301	7.8	118	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	4	180 - 240 mil
	Sul	401	7.9	120	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	250 - 300 mil
MT	Médio-Norte	402	7.9	109	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	250 - 320 mil
	Oeste	402	7.9	112	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	250 - 320 mil
	Vale do Araguaia	403	7.9	111	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	250 - 320 mil
PA	Sul	501	7.9	105	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	250 - 320 mil
	Norte	502	7.9	105	25/12 - 25/01	20/12 - 30/01	5	250 - 320 mil
PI	Sul	501	7.9	105	05/11 - 30/11	30/10 - 05/12	5	280 - 350 mil
RO	Acima de 400 m	402	7.9	109	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	250 - 320 mil
	Abaixo de 400 m	402	7.9	109	15/10 - 20/11	10/10 - 25/11	5	200 - 280 mil
TO	Sul	404	7.9	109	30/10 - 25/11	25/10 - 30/11	5	220 - 300 mil
	Transição	404	7.9	105	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	250 - 320 mil
	Transição	501	7.9	105	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	250 - 320 mil
	Campos Lindos	501	7.9	105	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	250 - 320 mil
SP	Norte	302	7.8	125	20/10 - 25/11	15/10 - 30/11	4	160 - 200 mil

¹ Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas, considerando os dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.



PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Resistência ao nematoide-de-cisto
- Ideal para ambientes de alta tecnologia

GM – 7.9

PMG – 157 g

Exigência em fertilidade – Alta


Hábito de crescimento – Indeterminado

Ramificação – Alta

Acamamento – Moderadamente resistente

NEMATOIDES – CISTO

Resistência moderada às raças 3, 6, 9, 10, 14 e 14+.



TECNOLOGIA

INTACTA2
XTEND



RECOMENDAÇÕES

Estado	Detalhe	Micro	Grupo de maturação	Ciclo médio (dias) ¹	Preferencial	Tolerado	Exigência à fertilidade	População (plantas/ha)
MT	Sul	401	7.9	114	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	250 - 300 mil
	Médio-Norte	402	7.9	109	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	250 - 320 mil
	Oeste	402	7.9	110	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	250 - 320 mil
	Vale do Araguaia	403	7.9	109	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	250 - 320 mil
RO	Acima de 400 m	402	7.9	110	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	250 - 320 mil
	Abaixo de 400 m	402	7.9	110	15/10 - 20/11	10/10 - 25/11	5	200 - 280 mil
BA	Beira da Serra	405	7.9	111	30/10 - 25/11	25/10 - 30/11	5	200 - 280 mil
	Oeste (irrigado)	405	7.9	122	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	5	180 - 240 mil

¹ Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas, considerando os dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.



PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Ampla região de adaptação
- Resistência ao nematoide-de-cisto

GM – 8.0

PMG – 178 g

Exigência em fertilidade – Alta

Hábito de crescimento – Indeterminado


Ramificação – Média

Acamamento – Moderadamente resistente

NEMATOIDES – CISTO

Resistência à raça 3 e 14.

Resistência moderada às raças 6, 9, 10 e 14+.



TECNOLOGIA



RECOMENDAÇÕES

Estado	Detalhe	Micro	Grupo de maturação	Ciclo médio (dias) ¹	Preferencial	Tolerado	Exigência à fertilidade	População (plantas/ha)
BA	Oeste (irrigado)	405	8.0	120	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	5	180 - 240 mil
	Sul	401	8.0	111	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	250 - 320 mil
MT	Oeste	402	8.0	108	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	280 - 320 mil
	Médio-Norte	402	8.0	108	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	280 - 320 mil
	Vale do Araguaia	403	8.0	112	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	280 - 320 mil
RO	Acima de 400 m	402	8.0	111	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	5	280 - 320 mil
	Abaixo de 400 m	402	8.0	111	15/10 - 25/11	10/10 - 30/11	5	200 - 280 mil
TO	Sul	404	8.0	113	30/10 - 25/11	25/10 - 30/11	5	200 - 300 mil
	Transição	404	8.0	109	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 280 mil
	Transição	501	8.0	109	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	5	220 - 280 mil

¹ Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas, considerando os dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.



PONTOS FORTES

- Potencial produtivo elevado
- Excelente sanidade
- Excelente adaptação para o Norte e Nordeste
- Elevado peso de grãos
- Ciclo médio M5 – 116 dias

GM – 8.2

PMG – 184 g


Porte – Alto (93 cm)

Exigência em fertilidade – Alta

Hábito de crescimento – Indeterminado

Ramificação – Média

Acamamento – Moderadamente resistente



TECNOLOGIA

INTACTA RR2 PRO™



RECOMENDAÇÕES

Estado	Detalhe	Micro	Grupo de maturação	Ciclo medio (dias) ¹	Preferencial	Tolerado	Exigencia à fertilidade	População (plantas/ha)
BA	Oeste (sequeiro)	405	7.9	112	05/11 - 25/11	30/10 - 30/11	4	220-300 mil
	Oeste (irrigado)	405	7.9	115	05/10 - 25/11	01/10 - 30/11	4	180 - 240 mil
GO	Norte	404	8.2	118	20/10 - 25/11	15/10 - 30/11	4	180 - 250 mil
MA	Batavo	501	8.1	109	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	4	240 - 320 mil
	Sul	501	8.1	108	30/10 - 30/11	25/10 - 05/12	4	280 - 350 mil
MT	Sul	401	8.1	113	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	4	250 - 300 mil
	Oeste	402	8.1	113	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	4	250 - 320 mil
	Médio-Norte	402	8.1	113	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	4	250 - 320 mil
	Sudoeste	402	8.1	113	15/10 - 20/11	10/10 - 25/11	4	200 - 280 mil
	Vale do Araguaia	403	8.1	113	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	4	250 - 320 mil
PA	Sul	501	8.1	111	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	4	220 - 320 mil
	Norte	502	8.1	107	25/12 - 25/01	20/12 - 30/01	4	250 - 320 mil
PI	Sul	501	8.1	108	30/10 - 25/11	25/10 - 30/11	4	280 - 350 mil
RO	Acima de 400 m	402	8.1	113	05/10 - 20/11	01/10 - 25/11	4	250 - 320 mil
	Abaixo de 400 m	402	8.1	113	15/10 - 20/11	10/10 - 25/11	4	200 - 280 mil
TO	Sul	404	8.1	111	30/10 - 25/11	25/10 - 30/11	4	220 - 320 mil
	Norte	501	8.1	109	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	4	250 - 320 mil
	Campos Lindos	501	8.1	109	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	4	240 - 320 mil

¹ Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas, considerando os dias após a emergência.

PONTOS FORTES

- Resistência ao nematoide-de-cisto
- Ciclo médio - 113 dias
- Grande quantidade de vagens de 3 e 4 grãos
- Biotecnologia Intacta2 Xtend®
- Alto pegamento de vagens

GM – 8.2

PMG – 160 g

Porte – Alto (104 cm)

Exigência em fertilidade – Alta

Hábito de crescimento – Indeterminado


Ramificação – Média

Acamamento – Moderadamente resistente

NEMATOIDES – CISTO

Resistência à raça 3.

Resistência moderada às raças 6, 9, 10 e 14.



TECNOLOGIA

INTACTA2
XTEND



RECOMENDAÇÕES

Estado	Detalhe	Micro	Grupo de maturação	Ciclo médio (dias) ¹	Preferencial	Tolerado	Exigência à fertilidade	População (plantas/ha)
BA	Oeste (sequeiro)	405	8.2	120	05/11 - 25/11	30/10 - 30/11	3	180 - 260 mil
MA	Batavo	501	8.2	110	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	3	220 - 300 mil
	Sul	501	8.2	109	30/10 - 30/11	25/10 - 05/12	3	250 - 320 mil
MT	Sul	401	8.2	124	01/10 - 20/11	25/09 - 25/11	3	200 - 280 mil
	Sudoeste	402	8.2	113	15/10 - 20/11	10/10 - 25/11	3	200 - 280 mil
	Médio-Norte	402	8.2	112	01/10 - 20/11	25/09 - 25/11	3	220 - 300 mil
	Oeste	402	8.2	113	01/10 - 20/11	25/09 - 25/11	3	220 - 300 mil
	Vale do Araguaia	403	8.2	118	20/10 - 25/11	15/10 - 30/11	3	220 - 300 mil
PI	Sul	501	8.2	110	05/11 - 30/11	30/10 - 05/12	3	250 - 320 mil
RO	Abaixo de 400 m	402	8.2	114	10/10 - 20/11	05/10 - 25/11	3	180 - 250 mil
	Acima de 400 m	402	8.2	114	01/10 - 20/11	25/09 - 25/11	3	220 - 300 mil
TO	Sul	404	8.2	112	30/10 - 25/11	25/10 - 30/11	3	220 - 300 mil
	Norte	501	8.2	110	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	3	250 - 320 mil
	Campos Lindos	501	8.2	110	25/10 - 25/11	20/10 - 30/11	3	220 - 300 mil

¹ Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas, considerando os dias após a emergência.



PONTOS FORTES

- Resistência ao nematoide-de-cisto
- Folhas lanceoladas
- Excelente sanidade
- Biotecnologia Conkesta Enlist®
- Grande volume de grãos

GM – 8.3 (em MT e RO, comporta-se como GM 8.0)

PMG – 166 g


Porte – Alto (93 cm)

Exigência em fertilidade – Alta

Hábito de crescimento – Indeterminado

Ramificação – Média

Acamamento – Moderadamente resistente



NEMATÓIDES – CISTO

Resistência à raça 3.

Resistência moderada às raças 6, 9 e 14.

TECNOLOGIA



RECOMENDAÇÕES

Estado	Detalhe	Micro	Grupo de maturação	Ciclo médio (dias) ¹	Preferencial	Tolerado	Exigência à fertilidade	População (plantas/ha)
MT	Sul	401	8.3	125	10/10 - 20/11	05/10 - 25/11	5	250 - 320 mil
	Oeste	402	8.3	115	10/10 - 20/11	05/10 - 25/11	5	280 - 320 mil
	Médio-Norte	402	8.3	113	10/10 - 20/11	05/10 - 25/11	5	280 - 320 mil
	Vale do Araguaia	403	8.3	120	01/11 - 20/11	25/10 - 25/11	5	280 - 320 mil
RO	Abaixo de 400 m	402	8.3	115	20/10 - 20/11	15/10 - 25/11	5	220 - 280 mil
	Acima de 400 m	402	8.3	115	10/10 - 20/11	05/10 - 25/11	5	280 - 320 mil

¹ Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas, considerando os dias após a emergência.



dagma.com.br



AGRO AMAZÔNIA

agroamazonia.com.br